

Auteur : D'ORBIGNY 1845 (1), p.515, pl.408, fig.3-4.

Niveau : Turonien

Localité : Sainte-Cérotte (Sarthe)

Diagnose I. testâ oblongo-elongatâ, convexâ, angulosâ, sublaevigatâ, concentricè tenuiter undulatâ; latere anali producto, rotundato; latere buccali obliquè truncato.

Dimensions. Longueur, 72 mm. - Par rapport à la longueur largeur,  $\frac{60}{100}$ ; épaisseur d'une valve,  $\frac{34}{100}$ . - Angle apical de l'ensemble, 51°.

Coquille oblongue, plus longue que large, anguleuse en avant et en arrière; peu marquée de rides concentriques. Côté buccal coupé obliquement, anguleux à sa jonction à la région palléale, celle-ci plane en dessus, et anguleuse au point où elle s'unit à la région anale, qui est prolongée et arrondie. Crochets saillans.

Rapports et différences. Cette espèce a, par sa forme allongée, du rapport avec l'*I. impressus*, mais elle s'en distingue par son ensemble anguleux.

Localité. Elle est propre à l'étage turonien et a été recueillie par moi à Sainte-Cérotte (Sarthe).

Explication des figures. Pl.408, fig.3. Coquille de grandeur naturelle. De ma collection.

Fig.4. La même, vue sur les crochets.

## REMARQUES

La pièce unique ayant servi de type à d'Orbigny a été retrouvée (Catal. n° 6445).

Il s'agit d'un fragment corrodé et indéterminable de Lamellibranche et qui n'est très probablement pas un Inocérane. La forme citée par Guéranger (Album Sarthe, 1867, pl.25, fig.7, 12) est toute différente et doit être écartée de la synonymie.


Conclusion. Espèce non valable.

(1) D'ORBIGNY (A.). Paléontologie fr., Terr. Crét., t.II, 1845.

J. SORNAY



3



4



1

Fig. 3-4 - Figuration originale de d'Orbigny.

Fig. 1 - *I. angulosus*. Holotype, Turonien, Sainte-Cérotte (Sarthe). Vue latérale (x1). Coll. d'Orbigny. n° 6445.